

## PLAVO PRSKANJE VOĆKI

Značaj plavog prkanja je veliki. Treba ga obavljati svake godine. Namijeneno je smanjenju infektivnog potencijala sledećih prouzročivača bolesti:

- **Kod breskve - *Taphrina deformans*** - prouzročivač kovrdavosti lista breskve
- **Kod šljive i višnje - *Monilia spp.*** - prouzročivač sušenja cvetova i grana
- **Kod šljive - *Clasterosporium carpophyllum*** - prouzročivač šupljikavosti lišća
- **Kod jabuke - *Erwinia amylovora*** - prouzročivač bakterijske plamenjače

Ovo tretiranje treba obaviti kada padne više od dve trećine lista. Na tržištu ima više preparata na bazi bakra koji se mogu koristiti: Cuproxat, Cuprozin, Funguran, Bakar oksihlorid, Bakarni kreč i drugi. Kvalitet tretiranja mora da bude dobar, svaka grančica mora da bude dobro isprskana. Tretiranje obaviti po mirnom vremenu. Sa kvalitetno i na vreme obavljenim tretiranjem napr. kod breskve *Taphrina deformans* može da se suzbije i do 90 %.

13.11.2009.

Stručna služba za zaštitu bilja  
Poljoprivredna stručna služba Jagodina