

RANO PROLEĆNO PRSKANJE VOĆAKA I VINOVE LOZE

Posle završene rezidbe voćaka i vinove loze potrebno je izvršiti zimsko prskanje ili rano prolećno tretiranje. Ova tretiranja se izvode kao preventivna tretiranja protiv mnogih štetočina (štitastih vaši, lisnih vaši, kruškine buve, voćnih moljaca, kruškinog cvetojeda) i prouzrokovaca bolesti (čađave krastavosti jabuke i kruške, bakterijske paleži jabučastog voća, šupljikavosti lišća koštičavog voća, kovrdžavosti lišća breskve, eskorioze vinove loze).

Tretiranje se izvodi kada su temperature iznad 5 stepeni. Kvalitet tretiranja treba da bude dobar, da se isprskaju svi delovi voćke, i najviši letorasti, zato što se na njima nalaze položena jaja lisnih vašiju i drugih štetočina.

Za tretiranje se mogu koristiti preparati na bazi mineralnih ulja: BELO ULJE u koncentraciji 3-4%, GALMIN 2% u kombinaciji sa bakarnim preparatima (CUPROHAT, CUPROZIN i drugi) ili preparat CRVENO ULJE -1,5% za jabuku, a za krušku 2-3% radi suzbijanja kruškine buve.

Tretiranje se kod jabuke i kruške može izvršiti u fazi mišjih ušiju, a kod breskve treba tretiranje uraditi u fazi neposredno pred pucanje i u fazi pucanja pupoljaka i dodavanjem okvašivača Sylwet 0,1%.

Savetodavac za zaštitu bilja
Poljoprivredne stručne službe Jagodina
Dipl.ing.Ljiljana Jeremić

8.03.2010.