

Suzbijanje korova u strnim žitima

Pred nama je period kada treba primeniti neke od preparata za suzbijanje korovskih biljaka ustrnim žitima. Zbog toga, ovom prilikom dajemo kraći pregled nekih od herbicida koji se mogu primeniti u strnim žitima za suzbijanje nepoželjenih korovskih biljaka.

- **Lintur** (od početka do kraja bokorenja pšenice, u količini 150 gr/ha),
- **Deltazon** (od početka do završetka faze bokorenja, u količini 4 l/ha),
- **Cambio** ((od faze 3 lista pa do kraja bokorenja u količini 1 l/ha),
- **Avalon** (od faze 3 lista pa do kraja bokorenja u količini 1 l/ha),
- **Mustang** (od početka bokorenja pa do pojave prvog lista u količini 0,4 - 0,6 l/ha),
- **Sekator** (od faze trećeg lista do pojave lista zastavičara u količini 300 gr/ha),
- **Maton** (od sredine bokorenja do pojave prvog kolenca u količini 0,8-1,2 l/ha),
- **Starane** (od faze tri lista do pojave zastavičara u kolicini 0,6-1,2 l/ha),
- **Monosan herbi** (od sredine bokorenja do pojave prvog kolenca u količini 1,5-2,5 l/ha),
- **Monosan kombi super** (od sredine bokorenja do pojave prvog kolenca u kol. 4 l/ha),
- **Optika kombi** (od sredine bokorenja do faze vlatanja u količin 1,5-2 l/ha),
- **Esteron** (od bokorenja do pojave prvog kolenca u količini od 0,8-1 l/ha),
- **Lentemul D** (od bokorenja do pojave prvog kolenca u količini od 0,75-1 l/ha),
- **Korzo** (u fazi 3 lista pa do kraja bokorenja, u količini 1 l/ha) i dr.