

Suzbijanje korova u kukuruзу

Tokom aprila predstoji sadnja kukuruza. Zbog toga treba razmišljati o mogućnosti primene herbicida za suzbijanje nepoželjnih korovskih vrsta. U zavisnosti od toga koji korovi preovladavaju, da li se kukuruz gaji kao združen usev sa pasuljem ili bez poduseva mogu se primeniti neki od sledećih preparata:

1. Kukuruz sa podusevom (pasulj, tikva):

- **Stomp, Alahlor** (posle setve a pre nicanja u količini od **4-6** l/ha),
- **Dual gold** (posle setve a pre nicanja u količini od **1,2-1,4** l/ha),
- **Afalon, Liron, Linurex** (posle setve a pre nicanja u količini od **2** l/ha),
- **Galolin kombi, Afalon kombi** (posle sadnje a pre nicanja u količini **6-7** l/ha),
- **Deltacet, Harness, Acetohlor, Genius, Deltacet, Acetogal, Guardian** (posle setve a pre nicanja u količini **1,8-2,2** l/ha).
- **Deltacet plus** (posle setve a pre nicanja u količini **2,0-2,5** l/ha).
- **Deltazon** (kada je kukuruz u fazi 1-5 listova, u količini 3-4 l/ha).

2. Kukuruz bez poduseva, preporučujemo:

- **Cambio** (kukuruz u fazi 3-4 lista, u količini 2 l/ha),
- **Avalon** (kukuruz u fazi 3-4 lista, u količini 2 l/ha),
- **Lentemul Đ** (kada je kukuruz u fazi 3-5 listova, u količini 0,75 - 1 l/ha),
- **Mottivel** (kukuruz u fazi 4-6 listova u količini od **1** l/ha),
- **Tarot** (kukuruz u fazi 1-6 listova u količini **40-50** gr/ha uz dodatak okvašivača Trend **0.1%**),
- **Tarot plus** (kukuruz u fazi od 2- 7 listova u količini od **310-380 gr/ha**),
- **Callisto** (posle sadnje a pre nicanja ili posle nicanja kukuruza u količini **0,15-0,25** l/ha),
- **Merlin** (posle sadnje a pre nicanja ili posle nicanja kukuruza u količini od **0,135** kg./ha),
- **Equip** (kukuruz u fazi od 2-7 listova u količini od **2-2,5** l/ha),
- **Monosan herbi** (kukuruz u fazi 3 lista u količini od **1,5-2,5** l/ha),
- **Maton** (kukuruz u fazi 3 lista u količini od **0,8-1,2** l/ha).