

**ВОЂАРИ**  
ИЗВЕШТАЈНО ПРОГНОЗНА СЛУЖБА  
ПОЉОПРИВРЕДНЕ СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ “МОРАВИЦА” УЖИЦЕ  
**ОБЈАВЉУЈЕ**

**ЗАШТИТУ ЈАБУКЕ И КРУШКЕ**

ЗАШТИТУ ОБАВИТИ У ФАЗИ ПРЕЦВЕТАВАЊА  
У ФАЗИ КАО НА СЛИЦИ  
ЗАШТИТА СЕ ОБАВЉА У ЦИЉУ СУЗБИЈАЊА



**1. ПРОУЗРОКОВАЧА ЧАЂАВЕ КРАСТАВОСТИ (*Venturia sp.*)**  
ЗА СУЗБИЈАЊЕ ОВОГ ПАРЗИТА ПРЕПОРУЧУЈЕМО ЈЕДАН ОД СЛЕДЕЋИХ  
ФУНГИЦИДА:

- CAPTAN.....u konc. 0,25% (200 gr na 100 l vode)
- MANKOGAL.....u konc. 0,25% (250 gr na 100 l vode)
- SCORE.....u konc. 0,02% (20 gr na 100 l vode)
- STROBY.....u konc. 0,02% (20 gr na 100 l vode)
- ZATO.....u konc. 0,015% (15 gr na 100 l vode)
- CHORUS.....u konc. 0,02% (20 gr na 100 l vode)
- SYSTANE- MZ.....u konc. 0,30% (300 gr na 100 l vode)

Са кишним падавинама које су уследиле после прилично сувог периода, остварени су веома повољни услови за ширење инфекције како чађаве краставости јабуке и крушке, тако и пепелнице јабуке. У случају појаве града препорука је да се понови прскање, без обзира на то када је обављена претходна заштита. За ову намену препоручује се комбинација **Captana (0,25%)** и фунгицида као што су **Stroby или Score (0,02%)**, који су локалсистемици и имају деловање и на чађаву краставост и на пепелницу.

**2. ЗА СУЗБИЈАЊЕ ШТЕТНИХ ИНСЕКТА ПРЕПОРУЧУЈЕМО ЈЕДАН ОД СЛЕДЕЋИХ  
ИНСЕКТИЦИДА:**

- NURELLE-D.....u konc. 0.10% (100 ml na 100 l vode)
- KONZUL .....u konc. 0.10% (100 ml na 100 l vode)
- MOSPILAN.....u konc. 0,025%(25 gr na 100 l vode)
- CIPKORD.....u konc. 0,03% (30 gr na 100 l vode)

За сузбијање крушкине буве (*Psila pyri*) препорука је да се користи једно од следећих средстава:

- AVASTATE.....u konc. 0.075% (75 ml na 100 l vode)
- VERTIMES.....u konc. 0.075% (75 ml na 100 l vode)

**3. ПРОУЗРОКОВАЧА ПЕПЕЛНИЦЕ ЈАБУКЕ (*Podosphaera leucotricha*). ЗА ЗАШТИТУ ОД  
ПЕПЕЛНИЦЕ ПРЕПОРУЧУЈЕМО УПОТРЕБУ ЈЕДНОГ ОД СЛЕДЕЋИХ ФУНГИЦИДА:**

- TOPAS.....u konc. 0,04% (40 gr na 100 l vode)
- KARATAN EC.....u konc. 0,06% (60 gr na 100 l vode)

**ПРСКАТИ ТЕМЕЉНО СА ШТО ЈАЧИМ ПРИТИСКОМ НА ПУМПИ**