

ИЗВЕШТАЈНО ПРОГНОЗНА СЛУЖБА
ПОЉОПРИВРЕДНЕ СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ УЖИЦЕ
ОБЈАВЉУЈЕ
ЗАШТИТУ ЈАБУКЕ И КРУШКЕ

У ПОСЛЕДЊОЈ ДЕКАДИ ЈУНА

ЗАШТИТА СЕ СПРОВОДИ У ЦИЉУ СУЗБИЈАЊА:

1. ПРОУЗРОКОВАЧА ЧАЂАВЕ КРАСТАВОСТИ (*Venturiја unequalis*, *V. pirina*)

ЗА СУЗБИЈАЊЕ ОВОГ ПАРАЗИТА ПРЕПОРУЧУЈЕМО ЈЕДАН ОД СЛЕДЕЋИХ ФУНГИЦИДА:

- ANTRACOL WP-70 u konc. 0.20% (200 gr na 100 l vode)
- DITAN M -70 u konc. 0,30% (300 gr na 100 l vode)
- MANKOGAL 80 u konc. 0.25% (250 gr na 100 l vode)
- FOLPAN WP 50 u konc. 0,20% (200 gr na 100 l vode)
- SCORE u konc. 0,02% (20 ml na 100 l vode)
- PUNCH 40 EC u konc. 0,0075%(7,5 ml na 100 l vode)
- RUBIGAN u konc.0,04% (40 ml na 100 l vode)
- FOLICUR EM 50 WP u konc.0,075% (75 gr na 100 l vode)

2. ЗА СУЗБИЈАЊЕ ШТЕТНИХ ИНСЕКТА ПРЕПОРУЧУЈЕМО ЈЕДАН ОД СЛЕДЕЋИХ ИНСЕКТИЦИДА:

- BASUDIN 600 EW u konc. 0,15% (150 ml na 100 l vode)
- KARATE ZEON u konc. 0,03% (30 gr na 100 l vode)
- DECIS u konc. 0,03% (30 ml na 100 l vode)
- CIPKORD u konc. 0,03% (30 ml na 100 l vode)
- NURELL –D u konc. 0,10% (100 ml na 100 l vode)
- REBUS u konc. 0,10% (100 ml na 100 l vode)

Према стању на ловним клопкама у току је лет лептира друге генерације јабукиног смотавца. Због ефикасније заштите од инсеката потребно је користити неко друго препоручено средство у односу на претходно коришћено.

Ако до овог периода није било појаве краставости и пелнице, то значи да је јабука квалитетно штићена и да су успешно спречене примарне инфекције. У том случају препоручује се примена неког од фунгицида локалсистемика као што су Punch, Score, Rubigan, Folikur, која делују упоредо и на чађаву краставост и на пепелницу.

Уколико је популација крушкине буве (*Psila pyri*) још увек висока, препорука је да се користи једно од следећих средстава:

- ABASTATE u konc. 0.075% (75 ml na 100 l vode)
- VERTIMEC u konc. 0.075% (75 ml na 100 l vode)
- ENVIDOR u konc. 0.10% + 0,25% mineralnog ulja(80 ml+ 250 ml na 100 l vode)

Наведени препарати добро сузбијају и штетне гриње код јабуке и крушке.

НАПОМЕНА: У случају временских непогода праћених градом и оштећењима биљака, потребно је што пре поновити прскање, без обзира на време извођења претходног третирања. За ову намену се препоручују средства као што су Captan или Antracol, који су у функцији дезинфекције.