

ИЗВЕШТАЈНО ПРОГНОЗНА СЛУЖБА
ПОЉОПРИВРЕДНЕ СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ УЖИЦЕ
ОБЈАВЉУЈЕ

СУЗБИЈАЊЕ УЗРОЧНИКА ТРУЛЕЖИ ПЛОДОВА ЈАБУКЕ

15 ДАНА ПРЕ БЕРБЕ ПЛОДОВА

ЗАШТИТА СЕ СПРОВОДИ У ЦИЉУ СУЗБИЈАЊА ТРИ
НАЈЗНАЧАЈНИЈА ТИПА ТРУЛЕЖИ

1. МРКА ТРУЛЕЖ ПЛОДОВА ЈАБУКЕ, чији је узročник *Monilia fructigena*
2. ГОРКА ТРУЛЕЖ ПЛОДОВА чији је узročник *Glomerella cingulata*
3. ПЛАВА ТРУЛЕЖ ПЛОДОВА чији је узročник *Penicilium expansum*

Ови паразити настајују плодове током вегетације и у фази зрења. Касније, током складиштења настављају да се развијају на убраним плодовима узрокујући труљење већих размера. На тај начин плодови губе тржишну вредност, а трулеж се шири и на друге плодове у складишту. Ово захтева чешће пребирање плодова и повећање трошкова чувања.

За заштиту јабуке током зрења препоручује се један од следећих фунгицида:

- ZATO u konc. 0.015% (15 gr na 100 l vode)

- GALOFUNGIN u konc. 0,06% (60 gr na 100 l vode)

Ово третирање се обавља у фази технолошке зрелости плодова и то најкасније 15 дана пре бербе плодова.

На овај начин уз обавезно чишћење и дезинфекцију складишта пре бербе, спречава се појава труљења и продужава период чувања плодова.