



POLJOPRIVREDNA STRUČNA SLUŽBA „UŽICE“ DOO

31000 Užice Dimitrija Tucovića 125 Poštanski fah: 126
tel: 031/513 754 fax: 031/513 491 e-mail: pssuzice@sbb.rs


ИЗВЕШТАЈНО ПРОГНОЗНА СЛУЖБА ПСС УЖИЦЕ ОБЈАВЉУЈЕ

УПОТРЕБУ ХЕРБИЦИДА У РАТАРСТВУ

I СУЗБИЈАЊЕ КОРОВА У СТРНИМ ЖИТИМА

-У фази од бокорења до другог коленца

1. MONOSAN HERBI.....1,5-2,5 l/ha- за сва стрна жита озима и јара, изузев овса
2. LENTEMUL D.....0,75- 1 l/ha -за сва стрна жита озима и јара, изузев овса
3. MATON.....0,5-0,8 l/ha -за сва стрна жита озима и јара, изузев овса
4. MUSTANG.....0,4-0,6 l/ha-може се примењивати у свим озимим и јарим житима (изузев овса) и то од почетка бокорења до првог коленца
5. BASAGRAN4,0 l/ha- у фази бокорења
6. ARRAT.....0,15-0,2kg/ha- озима жита,-0,15 kg/ha јара жита(од почетка до крај бокорења)-добро сузбија Galium sp.



-У фази од трећег листа до појаве листа заставичара

7. STARANE 250...0,8-1,0 l/ha(у озимим) и 0,8 l/ha(у јарим житима),добро сузбија Galium sp. (Tomigan,Bonasa,Fox,Fluormark)
8. SECATOR.....0,150-0,300 kg/ha- (у озимим и јарим житима),добро сузбија Galium sp.
9. SECATOR OD.....0,15 l/ha -(у озимим и јарим житима),добро сузбија Galium sp.

II СУЗБИЈАЊЕ КОРОВА У КУКУРУЗУ

- После сетве а пре ницања

1. TROFI +TERBIS.....2,0 l/ha + 1,5 l/ha -потребно је да буде кише 5-7 дана након примене (уместо препарата TROFI могу се користити:Acetogal,Acetomark,Genius,Gvardian)
2. GARDOPRIM PLUS GOLD.....4,0-4,5 l/ha

-До 3 листа кукуруза

- 3.LUMAX.....3-3,5 l/ha примена у парцелама које нису закоровљене вишегодишњим коровима(до 2 листа кукуруза)
- 4.MERLIN DUO.....1,5-2,0 l/ha-после сетве а пре ницања или најкасније до трећег листа кукуруза, а корови до четвртог листа. Погодан је у условима сувог пролећа.

III СУЗБИЈАЊЕ КОРОВА У КРОМПИРУ

1. FRONTIER SUPER+STOMP.....1,0-1,2+4,0 l/ha -после сетве а пре ницања
2. SENCOR +DELTACET.....1 kg/ha + 1,8 l/ha -после сетве а пре ницања усева и корова
3. SENCOR - после сетве,пре ницања у дози 1 kg/ha;..... - после ницања у дози 0,75 kg/ha (DANCOR,TRIBUTE,LORD)

Пре примене препоручених средстава, прочитати упуство за употребу, које иде уз препарат. После употребе хербицида, потребно је прскалицу добро опрати пре њеног коришћења за друге намене.

Ужице,20.04.2010.