



ИЗВЕШТАЈНО ПРОГНОЗНА СЛУЖБА ПСС УЖИЦЕ ОБЈАВЉУЈЕ
УПОТРЕБУ ХЕРБИЦИДА У КУКУРУЗУ И КРОМПИРУ
ПОСЛЕ НИЦАЊА УСЕВА



I СУЗБИЈАЊЕ КОРОВА У КУКУРУЗУ

-Од трећег до петог листа (корективно третирање)

1. AVALON(CAMBIO).....2 l/ha (корови у фази од 2-6 листова)
2. MONOSAN HERBI.....1,5-2,5l/ha (корови у фази до 6 развијених листова)
3. LENTEMUL D.....0,75-1 l/ha(корови у фази до 6 развијених листова)
4. MUSTANG+MOTIVEL..... 0,6 l/ha+1l/ha(корови у фази од 2-6 листова)
5. MOTIVEL+CAMBIO.....1 l/ha+2 l/ha (корови у фази од 2-6 листова)
6. GRID 75-WG+BANVEL.....20g/ha+0,5l/ha (једногодишњи и вишегодишњи широколисни корови)

-Кукуруз до 6 листа кукуруза

7. MOTIVEL.....1,2 l/ha (корови у фази од 2-6 листова)
8. TAROT PLUS..... 0,3 kg/ha (усколисни корови 3-5 листова, а широколисни 2-6 листова)

-До појаве десетог листа

9. LAUDIS1,5-2,0 l/ha после ницања и корова и кукуруза, када су травни корови у почетном стадијуму пораста, широколисни у фази 4-6 листова, а кукуруз од 2-10 листова
10. CALLISTO.....0,25 l/ha после сетве а пре ницања или 0,20 l/ha после ницања кукуруза, а најкасније до појаве осмог листа.

II СУЗБИЈАЊЕ КОРОВА У КРОМПИРУ

1. SENCOR - пре ницања у дози 1 kg/ha;..... - после ницања у дози 0,50-0,75 kg/ha (DANCOR, TRIBUTE, LORD)
2. FUSILADE FORTE...0.8-1,3 l/ha-сузбијање травних корова (корови у фази интензивног пораста)
3. BASAGRAN.....2-3 l/ha-сузбијање широколисних корова у фази интензивног пораста

Пре примене препоручених средстава, прочитати упуство за употребу, које иде уз препарат(додати оквашивач ако је препоручено). После употребе хербицида, потребно је прскалицу добро опрати пре њеног коришћења за друге намене.