



# POLJOPRIVREDNA SAVETODAVNA I STRUČNA SLUŽBA „UŽICE“ DOO

31000 Užice Dimitrija Tucovića 125 Poštanski fah: 126  
tel: 031/513-754, 031/513-491 e-mail: pssuzice@sbb.rs

ИЗВЕШТАЈНО ПРОГНОЗНА СЛУЖБА ПССС УЖИЦЕ ОБЈАВЉУЈЕ  
ПРСКАЊЕ ЈАБУЧАСТОГ, КОШТИЧАВОГ ВОЋА И МАЛИНЕ

## У ОПАДАЊУ ЛИСТА

ПРСКАЊЕ СЕ ОБАВЉА РАДИ ДЕЗИНФЕКЦИЈЕ ВОЋНИХ СТАБАЛА У  
ЦИЉУ СУЗБИЈАЊА :

1. Проузроковача бактериозне пламењаче воћака (*Erwinia amylovora*), код јабучастог воћа, која је ове године била заступљена у појединим засадима јабуке и крушке.
2. Проузроковача рак рана на јабуци (*Nectria galigena*) и проузроковача црног рака (*Sphaeropsis malorum*).
3. Бактерије, узрочника рак рана и сушења грана коштичавог воћа (*Pseudomonas syringae*).
4. Проузроковача бактеријских и гљивичних обољења на малини.
5. Осталих бактерија и гљива, које могу да остваре инфекцију воћака преко повреда и у овом периоду године и да наставе ширење током наредне вегетације.

За ово третирање препоручујемо једно од бакарних средстава, која имају дезинфекциону улогу, и то:

- |                         |                |                        |
|-------------------------|----------------|------------------------|
| • CUPROXAT              | u konc. 0,50 % | (500 ml na 100 l vode) |
| • FUNGURAN              | u konc. 0,40 % | (400 gr na 100 l vode) |
| • BAKARNI OKSIHLORID 50 | u konc. 0,75 % | (750 gr na 100 l vode) |
| • CUPROZIN 35 WP        | u konc. 0,35 % | (350 gr na 100 l vode) |
| • CUPRABLAU Z           | u konc. 0,50 % | (500 gr na 100 l vode) |

Прскање је потребно извести темељно купањем стабала од врха крошње ка деблу, истим методом као и пролећна заштита.

Заштита бакарним фунгицидима у овом периоду и у фази бубрења и пуцања пупољака је веома важна у борби против бактеријских обољења на воћу. На тај начин се смањује инфекциони потенцијал паразита за наредну вегетацију.

УЖИЦЕ 26.10.2011.