



ИЗВЕШТАЈНО ПРОГНОЗНА СЛУЖБА ПССС УЖИЦЕ ОБЈАВЉУЈЕ **ЗАШТИТУ ЗАСАДА МАЛИНЕ ТОКОМ ЛИСТАЊА**

За правилно одабирање изданака малине потребно је да се сачека да се пупољци делимично развију. На овај начин се јасно уочавају оболели и изданци са измрзлим пупољцима који се уклањају. Они са добро развијеним пупољцима се везују за жицу. На дужни метар шпалира оставити 4-5 одабраних изданака. У великом броју засада није урађена пролећна заштита комбинацијом неког од препарата на бази минералног уља и бакарних средстава.

Заштита током листања је нарочито важна ако није обављено рано пролећно пркање.

За заштиту од болести одабрати неки од препоручених препарата и то:

- FUNGURAN..... 0,30% (300 г/ 100 л воде)
- CUPROXAT..... 0,35% (350 мл/ 100 л воде)
- CUPRABLAU Z..... 0,35% (350 г/ 100 л воде)
- CAPTAN..... 0,25% (250 г/ 100 л воде)
- AKORD WG..... 0,075% (75 г/ 100 л воде)

Против штетних инсеката у овој фази развоја малине користити неки од понуђених препарата:

- СІРКОРД или СУТХРИН..... 0,050% (50 мл у 100 л воде)
- ТАЛСТАР 10 ЕС или FOBOS..... 0,050% (50 мл у 100 л воде)
- АFINEX 0,020 % (20 г/ 100 л воде)
- АВАСТАТЕ или VERTIMEK 0,10 % (100 мл у 100 л воде)

Препарати Talstar (ili Fobos) и Vertimek (ili Abastate), поред инсектицидног имају деловање и на гриње.

PRIMENA HERBICIDA U ZASADIMA MALINE

За сузбијање корова у родним засадима препоручује се примена неког од хербицида:

- CASORON –G25-30 кг/ха (само у реду, у траке ширине око 0,5 м)
- FUSILADE FORTE.....1,3 л/ха (само за усколисне корове у порасту 10-15 цм)
- GALOP или AGRAM3-5 кг/ха (корови у порасту 10-15 цм)

Напомена:

- Casoron -G је земљишни хербицид који се користи у засадима старијим од 2 године. Примењује се веома рано, док још коров није изникао или је у почетној фази клијања и ницања. Може се применити и после копања или фрезеровања. За ефикасност овог земљишног хербицида потребна је задовољавајућа влажност земљишта. Препоручује се његова примена само у зони редова.
- Fusilade forte и Focus ultra се користи за сузбијање само усколисних корова који су изникли и у порасту 10-15 цм. На малину и на широколисне биљне врсте нема никакво неповољно деловање.
- Galop или Agram су контактни хербициди који се примењују на изникле корове пораста 10-15 цм. Мање количине хербицида су потребне ако доминирају широколисни корови, а веће количине су потребне за сузбијање усколисних корова. Хербицид се усваја листом и не креће се кроз биљку.