



POLJOPRIVREDNA SAVETODAVNA I STRUČNA SLUŽBA „UŽICE“ DOO

31000 Užice Dimitrija Tucovića 125 Poštanski fah: 126
tel: 031/513-754, 031/513-491 e-mail: pssuzice@sbb.rs

ИЗВЕШТАЈНО ПРОГНОЗНА СЛУЖБА ПССС УЖИЦЕ ОБЈАВЉУЈЕ ЗАШТИТУ ЗАСАДА МАЛИНЕ ДО 10 ДАНА ОД ПОЧЕТКА ЦВЕТАЊА

Цветање у засадима малине је ове године почело за око 5 до 7 дана раније него претходне. Ова заштита се примењује од почетка цветања малине да би се заштитили цветови од узрочника сиве трулежи плодова (*Botrytis cinerea*). Овај паразит остварује заразу преко цветних делова, а касније са развојем и сазревањем плодова изазива њихово труљење. У наредном периоду се очекује пад температуре и честе и обилне кишне падавине, које се смењују са сунчаним интервалима. Овакви услови веома погодују развоју овог паразита. За ову намену препоручује се коришћење неког од следећих средстава:

- | | | | |
|----------|------------------------|-----------------------|-----|
| - SWITCH | у концентрацији 0,08% | (80gr у 100 l воде) | или |
| - TELDOR | у концентрацији 0,15 % | (150 gr у 100 l воде) | или |
| - MYTHOS | у концентрацији 0,25% | (250ml у 100 l воде) | или |
| - PEHAR | у концентрацији 0,20% | (200ml у 100 l воде) | или |
| - PYRUS | у концентрацији 0,20% | (200ml у 100 l воде) | или |
| - SIGNUM | у концентрацији 0,15 % | (150 gr у 100 l воде) | |

Примена неког од ових средстава има искључиву намену за спречавање појаве трулежи плодова малине.

Временски услови утичу на интензиван пораст и развој родних гранчица и лисне масе. Све то ствара оптималне услове и за болести као што су *Didymella applanata* и *Leptosphaeria coniothyrium*. Због тога се једном од наведених средстава може додати:

- **QUADRIS** или **PROMESA** или **QUEEN** у концентрацији 0,075% (75 ml у 100 l воде)

SIGNUM делује истовремено и на сиву трулеж и на дидимелу, па у случају његове примене није потребно комбиновање са **QUADRIS**- ом.

Пре прскања потребно је прскалицу опрати детергентом и водом, добро је испрати, да се одстрани присуство инсектицида и других штетних материја за пчелу и плод малине.

Приликом овог третирања обавезно заштитити и младе изданке који се припремају за род наредне године. Прскање обавити у касним поподневним сатима и у препорученој фенофази развоја.

НАПОМЕНА:

ТОКОМ ТРАЈАЊА ЦВЕТАЊА, А КАСНИЈЕ И БЕРБЕ ПЛОВОДА У ЗАСАДИМА МАЛИНЕ СЕ НЕ СМЕЈУ КОРИСТИТИ ИНСЕКТИЦИДИ НИ АКАРИЦИДИ ! УПОЗОРАВАЈУ СЕ ПРОИЗВОЂАЧИ ДА СЕ ПРИ ПРИМЕНИ ХЕМИЈСКИХ СРЕДСТАВА У ЗАШТИТИ МАЛИНЕ ПРИДРЖАВАЈУ ДАТИХ УПУСТАВА У ПОГЛЕДУ ИЗБОРА, ВРЕМЕНА ЊИХОВЕ ПРИМЕНЕ И КАРЕНЦЕ У ЗАСАДИМА МАЛИНЕ.

ПРОИЗВОЂАЧИ, ПРИДРЖАВАЈТЕ СЕ ДАТИХ ПРЕПОРУКА ДА БИ СТЕ ПОСТИГЛИ ДОБАР КВАЛИТЕТ И ОМОГУЋИЛИ ДА МАЛИНА И ДАЉЕ ОСТАНЕ ГЛАВНИ ИЗВОЗНИ АРТИКАЛ !

УЖИЦЕ 08.05.2013.