



ПРОГНОЗНО ИЗВЕШТАЈНА СЛУЖБА ПССС УЖИЦЕ ОБЈАВЉУЈЕ

1. ПРСКАЊЕ ЈАБУЧАСТОГ ВОЋА (јабука, крушка, дуња, мушмула)

Обавити у фази пуцања пупољака (фаза развоја као на слици)

Ово прскање се обавља у циљу смањења инфективног потенцијала гљивичних и бактеријских обољења која презимљавају на гранама воћака, а нарочито *Erwinia amilovora* узročника бактеријске пламењаче јабучастог воћа. Овом заштитом су обухваћене и презимљујуће форме инсеката и гриња које такође презимљавају на гранама воћака. Прскање обавити после резидбе следећим средствима:



- **GALMIN**..... 2,0 – 3,0 % (2,0 do 3,0 kg u 100 l vode)
- **BELO ULJE** ili **NITROPOL-S**..... 2,0 % (2,0 do 3,0 kg u 100 l vode)

Горе наведени препарати ради проширења дејства и на узročнике болести, се могу комбиновати са препаратом **FUNGURAN 0,4%** (400 g u 100 l vode) **CUPROZIN 35 WP 0,35 %** ili **CUPRABLAU Z 0,35 %** (350 g u 100 l vode).

У овом периоду се могу применити и готове мешавине минералног уља и бакарних фунгицида, које се користе самостално:

- **PLAVO ULJE** ili **MODRO ULJE**.....2-3 % (2,0 do 3,0 l u 100 l vode)
- **BAKARNO ULJE** ili **CRVENO ULJE** ili **EOS**.....1-1,5 % (1,0 do 1,5 kg u 100 l vode)

У засадима јабуке који се налазе у близини шуме постоји ризик од појаве јабукиног цветоједа *Anthonomus pomorum* па је наведеним препаратима у овој фази потребно додати инсектицид **Cirkord** ili **Cytrin 0,05%** (50 ml u 100 l vode). Овај инсектицид се препоручује и у засадима крушке за сузбијање крушкине буве *Psylla pyri*.

2. ПРСКАЊЕ КОШТИЧАВОГ ВОЋА (шљива, бресква, грешња, вишња, кајсија)

Обавити у фази бубрења и пуцања пупољка као на слици

Сва средства која су наведена за јабучасто воће, могу се применити и за коштичаво воће, након обављене резидбе, а у фази бубрења и пуцања пупољака (почетак вегетације). Овим третирањем спречава се ширење заразе гљивом *Taphrina cerasi* узročника појаве тзв. „вештичијих метли“ на гранама шљиве, уз обавезу претходног уклањања оболелих грана. За заштиту брескве од коврцавости листа (гљива *Taphrina deformans*) ово прскање се обавља у фази појаве зелене тачке на врху пупољка. Наредно третирање брескве се обавља након 5-7 дана препаратом **Dakoflo 0,2%** или **Delan 700WG 0,07%** или **Sillit 400SC 0,25%**.



3. ПРСКАЊЕ МАЛИНЕ И КУПИНЕ

Обавити у фази као на слици, након везивања изданака

- **GALMIN 2,0 % (2,0 kg u 100 l vode) + CUPROZIN 35 WP 0,35 % (350 g u 100 l vode)** ili
- **BELO ULJE 2,0 % (2,0 kg u 100 l vode) + CUPRABLAU Z 0,35 % (350 g u 100 l vode)** ili
- **PLAVO ULJE 2-3 % (2,0 do 3,0 l u 100 l vode)**- примењује се самостално



Напомена: Прскање обавити по сувом и тихом времену. Потребно је извршити купање биљака већом количином течности, третирањем одозго на доле при смањеном притиску на прскалицу. Температура ваздуха при прскању треба да је преко 7 °C, а пожељно је да не буде падавина најмање 3-4 сата по обављеном прскању.