



ИЗВЕШТАЈНО ПРОГНОЗНА СЛУЖБА ПССС УЖИЦЕ ОБЈАВЉУЈЕ

## **ЗНАЧАЈ И ЗАШТИТА ПЧЕЛЕ У ВОЋАРСКОЈ ПРОИЗВОДЊИ**

**НАЈВЕЋИ САРАДНИК У ПРОИЗВОДЊИ ВОЋА ЈЕ ПЧЕЛА**

- ОПРАШИ ПРЕКО 90% ЦВЕТОВА,
- ОБЕЗБЕЂУЈЕ ВЕЋИ И СИГУРНИЈИ РОД,
- ОБЕЗБЕЂУЈЕ БОЉУ КРУПНОЋУ И ОБЛИК ПЛОДА.

**ЗА ОПРАШИВАЊЕ ЈЕДНОГ ХЕКТАРА ВОЋЊАКА ПОТРЕБНО ЈЕ ДВА ПЧЕЛИЊА ДРУШТВА.**

**МАРЉИВОСТ ПЧЕЛЕ СЕ ОГЛЕДА У ЊЕНОМ ИЗВАНРЕДНОМ УЧИНКУ:**

- ПОСЕТИ 10 ЦВЕТОВА ЗА 1 МИНУТ,
- ЈЕДАН ИЗЛЕТ ТРАЈЕ 10 МИНУТА, ЗА КОЈЕ ВРЕМЕ ОПРАШИ 100 ЦВЕТОВА,
- ДНЕВНИ УЧИНАК ПЧЕЛЕ ЈЕ ОКО 4.000 ОПРАШЕНИХ ЦВЕТОВА, ШТО ДАЈЕ

**ОКО 15 КИЛОГРАМА ПЛОДА МАЛИНЕ.**

**ПОСЕБНО ЈЕ ВАЖАН УЧИНАК ПЧЕЛЕ ЗА ОПРАШИВАЊЕ У МАЛИЊАЦИМА И ДРУГОМ ЈАГОДАСТОМ ВОЋУ, ГДЕ ЈЕ ЗА ПОСТИЗАЊЕ ВИСОКИХ ПРИНОСА ПОТРЕБНО ДА СЕ ИЗ СВАКОГ ЦВЕТА ФОРМИРА ПЛОД!**

**УВАЖЕНИ ВОЋАРИ, ПРЕМА ПЧЕЛИ, БЕСПЛАТНОМ САРАДНИКУ У ПРОИЗВОДЊИ ВОЋА, ПОНАШАЈТЕ СЕ КРАЈЊЕ ДОМАЋИНСКИ:**

**-ПРСКАЊЕ ИНСЕКТИЦИДИМА УРАДИТИ ПРЕД САМО ЦВЕТАЊЕ КОД ЈАГОДАСТОГА ВОЋА (МАЛИНА), А СЛЕДЕЋЕ ТЕК ПО ЗАВРШЕНОЈ БЕРБИ, ДОК КОД ДРВЕНСТОГ ВОЋА СЛЕДЕЋЕ ПРСКАЊЕ ИНСЕКТИЦИДИМА ТРЕБА УРАДИТИ ПОСЛЕ ПРЕЦВЕТАВАЊА,**

**-У ВРЕМЕ ЦВЕТАЊА МОГУЋА ЈЕ ЈЕДИНО ПРИМЕНА ФУНГИЦИДА РАДИ СПРЕЧАВАЊА ПОЈАВЕ ТРУЉЕЊА ПЛОДОВА, А ПО ПРЕПОРУЦИ СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ,**

**-ПРЕ ТОГА ЈЕ НЕОПХОДНО ПРСКАЛИЦУ ДОБРО ИСПРАТИ ТОПЛОМ ВОДОМ И ДЕТЕРЦЕНТОМ ОД ОСТАКА ИНСЕКТИЦИДА .**

**-УКОЛИКО У ВОЋЊАЦИМА ИМА ЦВЕТАЛОГ КОРОВА (МАСЛАЧАК И СЛ.) ПОТРЕБНО ГА ЈЕ ПРЕ ПРСКАЊА ИНСЕКТИЦИДИМА ПОКОСИТИ, ЧИМЕ СЕ ИЗБЕГАВА ТРОВАЊЕ ПЧЕЛА ПРЕКО ЦВЕТА КОРОВСКИХ БИЉАКА.**

**ПОСЕБНА НАПОМЕНА ЗА ПРОИЗВОЂАЧЕ МАЛИНЕ:**

**-ПОСЛЕДЊЕ ПРСКАЊЕ У МАЛИЊАЦИМА РАДИ СПРЕЧАВАЊА ПОЈАВЕ ТРУЉЕЊА ПЛОДОВА ОБАВИТИ У СКЛАДУ СА КАРЕНЦОМ СА ДЕКЛАРАЦИЈЕ (ВЕЋИНОМ НА 10 ДАНА ПРЕ ПОЧЕТКА БЕРБЕ).**

**-ОД ТАДА ПА ДО ЗАВРШЕТКА БЕРБЕ ПЛОДОВА ЗАБРАЊЕНО ЈЕ ПРСКАЊЕ ПРОТИВ БОЛЕСТИ И ШТЕТОЧИНА У МАЛИЊАЦИМА.**

**ОВАКВИМ НАЧИНОМ РАДА У МАЛИЊАЦИМА МОГУЋЕ ЈЕ ЗАШТИТИТИ ПЧЕЛУ ОД ТРОВАЊА У ВРЕМЕ ЦВЕТАЊА, И ОБЕЗБЕДИТИ ДА ПЛОД БУДЕ ЗДРАВСТВЕНО БЕЗБЕДАН И БЕЗ ОСТАКА ПЕСТИЦИДА.**

**ЗА ПРСКАЊЕ МИМО ДАТИХ ПРЕПОРУКА ПРЕДВИЂЕНЕ СУ ВИСОКЕ КАЗНЕ!**