



POLJOPRIVREDNA SAVETODAVNA I STRUČNA SLUŽBA „UŽICE“ DOO

31000 Užice Dimitrija Tucovića 125 Poštanski fah: 126
tel: 031/513-754, 031/513-491 e-mail: pssuzice@sbb.rs

ИЗВЕШТАЈНО ПРОГНОЗНА СЛУЖБА ПССС УЖИЦЕ ОБЈАВЉУЈЕ ЗАШТИТУ УСЕВА КРОМПИРА У ПРВОЈ ДЕКАДИ ЈУНА

ЗАШТИТА СЕ СПРОВОДИ У ЦИЉУ СУЗБИЈАЊА:

1. ПРОУЗРОКОВАЧА ПЛАМЕЊАЧЕ КРОМПИРА (Ph. infestans)

Временске прилике које карактерише честа смена кишовитог и сунчаног периода током истог дана и изгледи времена у наредном периоду су погодни за развој гљиве (Ph. infestans) узрочника пламењаче кромпира. Услови за појаву пламењаче су нарочито погодни у усевима кромпира који су у фази склапања редова. Због тога је потребно да се изврши превентивна заштита у усевима кромпира.

Прскање се може извршити са једним од препоручених препарата:

- | | |
|-----------------------------------|----------------------|
| - CUPROZIN 35WP | у дози 2,75 кг/ха |
| - CUPROXAT | у дози 2,0 л/ха |
| - ANTRACOL | у дози 1,8-2,0 кг/ха |
| - DAKOFLO | у дози 3,0 л/ха |
| - FUZIJA | у дози 2,5 л/ха |
| - RIDOMIL GOLD MZ 68 WG | у дози 3,0 кг/ха |
| - CURZATE M WG (или CURZATE R WG) | у дози 3,0 кг/ха |
| - EQUATION PRO WG | у дози 0,4 кг/ха |
| - CONSENTO | у дози 1,8-2,0 кг/ха |

Препоручује се да се прва заштита кромпира од пламењаче обави препаратима који су појачани са бакарним фунгицидом (Curzate R WG). Такође, могуће је и извршити комбиновање бакарних фунгицида са препорученим средствима.

2. КРОМПИРОВЕ ЗЛАТИЦЕ (L. decemlineata)

Прскање се може обавити са неким од препоручених инсектицида:

- | | |
|-------------------|----------------------|
| - MATCH 050 EC | у дози 300-400 гр/ха |
| - AKTARA | у дози 70 гр/ха |
| - CONFIDOR 200 SL | у дози 300 мл/ха |
| - CONFIDOR 70 WG | у дози 100 гр/ха |
| - MOSPILAN | у дози 250 гр/ха |
| - TONUS | у дози 250 гр/ха |
| - CALYPSO 480 SC | у дози 100 мл/ха |

Ако је златица у фази положених јаја или почетка пиљења може се применити инсектицид Match 050 EC који има овицидно и ларвицидно деловање, блокира пиљење, а касније и пресвлачење ларви. Остали препоручени инсектициди се примењују када се из јаја на наличју листа излегло 30-40% ларви, односно када се уоче прве Л2 ларве.

НАПОМЕНА: На теренима који су захваћени градом и оштећењима биљака кромпира, препоручује се што хитнија заштита таквих биљака коришћењем превасходно неког од бакарних средстава, јер је оштећена биљка много подложнија нападу пламењаче и других болести кромпира.

УЖИЦЕ 26.05.2014.