



POLJOPRIVREDNA SAVETODAVNA I STRUČNA SLUŽBA „UŽICE“ DOO

31000 Užice Dimitrija Tucovića 125 Poštanski fah: 126
tel: 031/513-754, 031/513-491 e-mail: pssuzice@sbb.rs

ИЗВЕШТАЈНО ПРОГНОЗНА СЛУЖБА ПССС УЖИЦЕ ОБЈАВЉУЈЕ ЗАШТИТУ ЈАБУКЕ И КРУШКЕ У ЗАДЊОЈ ДЕКАДИ МАЈА

ЗАШТИТА СЕ СПРОВОДИ У ЦИЉУ СУЗБИЈАЊА:

1. ПРОУЗРОКОВАЧА ЧАЂАВЕ КРАСТАВОСТИ (*Venturia inequalis*, *V. pirina*)

ЗА СУЗБИЈАЊЕ ОВОГ ПАРАЗИТА ПРЕПОРУЧУЈЕМО ЈЕДАН ОД СЛЕДЕЋИХ ФУНГИЦИДА:

- | | |
|------------------------|--------------------------------------|
| - ANTRACOL WP-70 | u konc. 0.20% (200 gr na 100 l vode) |
| - CAPTAN | u konc. 0.20% (200 gr na 100 l vode) |
| - MANKOGAL 80 | u konc. 0.25% (250 gr na 100 l vode) |
| - SCORE (ili SEKVENCA) | u konc. 0,02% (20 ml na 100 l vode) |
| - CLARINET | u konc. 0,15% (150 ml na 100 l vode) |
| - ZATO | u konc. 0,015% (15 gr na 100 l vode) |
| - OLYMP 10 EW | u konc. 0,03% (30 ml na 100 l vode) |
| - TERCEL | u konc. 0,20% (200 gr na 100 l vode) |
| - ACORD | u konc. 0,03% (30 ml na 100 l vode) |
| - INDAR | u konc. 0,08% (80 ml na 100 l vode) |

У засадима јабуке чађава пегавост је углавном заступљена на лишћу, али је важно наставити са заштитом, како би се спречила појава на плодовима. У том случају препоручује се примена неког од фунгицида локалсистемика као што су Score, Zato, Rubigan или Tercel, која делују упоредо и на чађаву краставост и на пепелницу.

2. ЗА СУЗБИЈАЊЕ ШТЕТНИХ ИНСЕКТА ПРЕПОРУЧУЈЕМО ЈЕДАН ОД СЛЕДЕЋИХ ИНСЕКТИЦИДА:

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| - KARATE ZEON | u konc. 0,03% (30 gr na 100 l vode) |
| - CIPKORD | u konc. 0,03% (30 ml na 100 l vode) |
| - TALSTAR (ili FOBOS) | u konc. 0,06% (60 ml na 100 l vode) |
| - MATCH 050 EC | u konc. 0,10% (100 ml na 100 l vode) |
| - RUNNER | u konc. 0,06% (60 ml na 100 l vode) |
| - CORAGEN 20 SC | u konc. 0,02% (20 ml na 100 l vode) |
| - TONUS 0,025% + HARPUN 0,10% | (25 gr + 100 ml na 100 l vode) |

Због ефикасније заштите од инсеката потребно је користити неко друго препоручено средство у односу на претходно коришћено.

Уколико је популација крушкине буве (*Psila pyri*) још увек висока, препорука је да се користи једно од следећих средстава:

- | | |
|------------|--|
| - ABASTATE | u konc. 0,075% (75 ml na 100 l vode) |
| - VERTIMEC | u konc. 0,075% (75 ml na 100 l vode) |
| - ENVIDOR | u konc. 0,08% + 0,25% mineralnog ulja(80 ml+ 250 ml na 100 l vode) |

Наведени препарати добро сузбијају и штетне гриње код јабуке и крушке.

НАПОМЕНА: У случају временских непогода праћених градом и оштећењима биљака, потребно је што пре поновити прскање, без обзира на време извођења претходног третирања. За ову намену се препоручују средства као што су Captan или Antracol за дезинфекцију насталих повреда.

УЖИЦЕ 22.05.2014.