



ИЗВЕШТАЈНО ПРОГНОЗНА СЛУЖБА ПССС УЖИЦЕ ОБЈАВЉУЈЕ ЗАШТИТУ УСЕВА КРОМПИРА ПОЧЕТКОМ ЈУЛА

ЗАШТИТА СЕ СПРОВОДИ У ЦИЉУ СУЗБИЈАЊА:

1. ПРОУЗРОКОВАЧА ПЛАМЕЊАЧЕ КРОМПИРА (*Ph. infestans*)

Усеви кромпира су у фази цветања и склапања редова. У овој фази развоја кромпира је карактеристично слабије проветравање између редова. Значајне осцилације између дневних и ноћних температура утичу на формирање росе и њено дуже задржавање на лишћу. Овакви услови повећавају ризик од појаве и ширења пламењаче кромпира (*Ph. infestans*). Због јаког сунчевог зрачења често долази до појаве ожеготина на лишћу. За заштиту се препоручују следећи фунгициди:

- | | |
|-----------------------------------|----------------------|
| - CUPROXAT | у дози 2,0 л/ха |
| - FUNGURAN | у дози 2,0 кг/ха |
| - CUPROZIN 35WP | у дози 2,75 кг/ха |
| - ANTRACOL | у дози 1,8-2,0 кг/ха |
| - DAKOFLO | у дози 3,0 л/ха |
| - MANKOGAL-80 | у дози 2,5 кг/ха |
| - DITHANE M- 70 | у дози 2,5-3,0 кг/ха |
| - RIDOMIL GOLD MZ 68 WP | у дози 2,5 кг/ха |
| - FUZIJA | у дози 2,5 л/ха |
| - CURZATE M WG (или CURZATE R WG) | у дози 3,0 кг/ха |
| - EQUATION PRO WG | у дози 0,4 кг/ха |
| - CONSENTO | у дози 1,8-2,0 кг/ха |
| - REVUS 250 SC | у дози 0,5-0,6 л/ха |

Применом препоручених фунгицида постиже се и заштита од антракнозе – црне пегавости (проузроковач *Alternaria solani* и *Alternaria alternata*). Ако је у усеву кромпира дошло до појаве пламењаче, потребно је применити системичне фунгициде као што су Ridomil gold, Curzate, Equation pro или Fuzija, а заштиту поновити у наредних седам дана.

2. КРОМПИРОВЕ ЗЛАТИЦЕ (*L. decemlineata*)

Прскање се може обавити са неким од препоручених средстава:

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| - MOSPILAN (или TONUS или AFINEX) | у дози 250 гр/ха |
| - АСТАРА | у дози 70 гр/ха |
| - CONFIDOR 200 SL | у дози 300 мл/ха |
| - CALYPSO 480 SC | у дози 100 мл/ха |
| - CORAGEN | у дози 50-60 мл/ха |

Препоручени инсектициди се могу применити када се из јаја на наличју листа излегло 30-40% ларви, при чему су најосетљивије младе ларве Л1 и Л2.

НАПОМЕНА: У случају временских непогода праћених градом и оштећењима биљака кромпира, потребна је што хитнија заштита таквих биљака коришћењем превасходно неког од бакарних средстава, јер је оштећена биљка много подложнија нападу пламењаче.