



ИЗВЕШТАЈНО ПРОГНОЗНА СЛУЖБА ПССС УЖИЦЕ ОБЈАВЉУЈЕ
УПОТРЕБУ ХЕБИЦИДА У КУКУРУЗУ

-После сетве, пре ницања

1. DUAL GOLD 960EC (Mont, Basar)+ REZON(Terbis).....1,5+2 l/ha-после сетве, а пре ницања
2. MONT PLUS.....4,0-5,0 l/ha-после сетве, а пре ницања
3. GARDOPRIM PLUS GOLD(Calaris pro).....4,0-4,5 l/ha -после сетве, а пре ницања до 8.листа кукуруза
4. DUAL GOLD 960EC(Mont, Basar) + AFALON tečni(Linar, Galolin mono).....1,3+2,0 l/ha- после сетве, а пре ницања (ако је подусев пасуљ)
5. STOMP 330E(Pendistop, Zanat)+ AFALON tečni(Linar, Galolin mono).....4,0+2l/ha- после сетве, а пре ницања (ако је подусев пасуљ)



-До трећег листа кукуруз

1. TERBIS + MUSTANG.....1+0,6 l/ha- после сетве, а пре ницања или најкасније до трећег листа кукуруза
2. MERLIN FLEXX.....0,40 l/ha- после сетве, а пре ницања или најкасније до трећег листа кукуруза, а корови до четвртог листа. Погодан је у условима сувог пролећа
3. LUMAX.....3-3,5 l/ha примена у парцелама које нису закоровљене вишегодишњим коровима: паламида, попонац (до 2 листа кукуруза)
4. CALARIS PRO2,0-2,3 l/ha – након ницања, до 8 листа кукуруза

-Од трећег до петог листа (корективно третирање)

1. MONOSAN HERBI1,5-2,5 l/ha (корови у фази до 6 развијених листова)
2. MUSTANG.....0,6 l/ha (корови у фази до 6 развијених листова)
3. SIRAN 40SC(Talisman)+agro Dimark(Plamen).....1 l/ha+0,5 l/ha (корови у фази од 2-6 листова)
4. TALISMAN(Siran 40SC)+AVALON(Cambio).....1+2 l/ha (корови у фази од 2-6 листова)
5. GRID 75-WG+BANVEL.....20g/ha+0,5 l/ha (једногодишњи и вишегодишњи широколисни и усколисни корови)

-Кукуруз до 6 листа кукуруза

1. MOTIVELL EXTRA 60D.....0,75 l/ha (корови у фази од 2-6 листова)
2. TAROT PLUS.....0,3 kg/ha (усколисни корови 3-5 листова, а широколисни 2-6 листова)
3. TANGENTA+ TALISMAN.....1+1 l/ha (после ницања усева, када су корови у фази од 2-6 листова, а дивљи сирак висине 15-20 цм)
4. TALISMAN + SKAUT.....1+0,25 l/ha (корови у фази од 2-6 листова)
5. NICOGAN+CHIEF.....1+1 l/ha (корови у фази од 2-6 листова)

-Кукуруз у фази осмог до десетог листа

1. LAUDIS1,5- 2,0 l/ha кукуруз у фази од 2-10 листова (широколисни корови у фази 4-6 листова)
2. EQUIP.....2-2,5 l/ha, кукуруз у фази од 2-8 листова (када су травни корови 1-5 листова)
3. CALLISTO 50WG.....0,25 kg/ha после сетве а пре ницања или 0,20 l/ha после ницања кукуруза, а најкасније до појаве осмог листа.
4. FOCUS ULTRA *.....1,5-4 l/ha(травне корове) примењује се искључиво у ULTRA* хибридима кукуруза који су толерантни на овај хербицид (NS444-ultra и NS640-ultra; ZP360-ultra и ZP 684 ultra) 1,5-2l/ha дивљи сирак из ризома, 3-4l/ha пиревина, зубача