



# POLJOPRIVREDNA SAVETODAVNA I STRUČNA SLUŽBA „UŽICE“ DOO

31000 Užice Dimitrija Tucovića 125 Poštanski fah: 126  
tel: 031/513-754, 031/513-491 e-mail: pssuzice@sbb.rs

## ИЗВЕШТАЈНО ПРОГНОЗНА СЛУЖБА ПССС УЖИЦЕ ОБЈАВЉУЈЕ ЗАШТИТУ УСЕВА КРОМПИРА ДО ПОЛОВИНЕ ЈУЛА

### **ЗАШТИТА СЕ СПРОВОДИ У ЦИЉУ СУЗБИЈАЊА:**

#### **1. ПРОУЗРОКОВАЧА ПЛАМЕЊАЧЕ КРОМПИРА (*Ph. infestans*)**

Усеви кромпира су у фази цветања и склапања редова. У овој фази развоја кромпира је карактеристично слабије проветравање између редова. Значајне осцилације између дневних и ноћних температура утичу на формирање росе и њено дуже задржавање на лишћу. Овакви услови повећавају ризик од појаве и ширења пламењаче кромпира (*Ph. infestans*). Због јаког сунчевог зрачења често долази до појаве ожеготина на лишћу. За заштиту се препоручују следећи фунгициди:

- CUPROXAT	у дози 2,0 л/ха
- FUNGURAN	у дози 2,0 кг/ха
- CUPROZIN 35WP	у дози 2,75 кг/ха
- ANTRACOL	у дози 1,8-2,0 кг/ха
- DAKOFLO	у дози 3,0 л/ха
- MANKOGAL-80	у дози 2,5 кг/ха
- DITHANE M- 70	у дози 2,5-3,0 кг/ха
- RIDOMIL GOLD MZ 68 WP	у дози 2,5 кг/ха
- FUZIJA	у дози 2,5 л/ха
- CURZATE M WG (или CURZATE R WG)	у дози 3,0 кг/ха
- EQUATION PRO WG	у дози 0,4 кг/ха
- CONSENTO	у дози 1,8-2,0 кг/ха
- REVUS 250 SC	у дози 0,5-0,6 л/ха

Применом препоручених фунгицида постиже се и заштита од антракнозе – црне пегавости ( проузроковач *Alternaria solani* i *Alternaria alternata*). Ако је у усеву кромпира дошло до појаве пламењаче, потребно је применити системичне фунгициде као што су Ridomil gold, Curzate, Equation pro или Fuzija, а заштиту поновити у наредних седам дана.

#### **2. КРОМПИРОВЕ ЗЛАТИЦЕ (*L. decemlineata*)**

Заштита се може обавити неким од препоручених средстава:

- MOSPILAN (ili TONUS ili AFINEX)	у дози 250 гр/ха
- АСТАРА	у дози 70 гр/ха
- CONFIDOR 200 SL	у дози 300 мл/ха
- CALYPSO 480 SC	у дози 100 мл/ха
- CORAGEN	у дози 50-60 мл/ха

Препоручени инсектициди се могу применити када се из јаја на наличју листа излегло 30-40% ларви, при чему су најосетљивије младе ларве Л1 и Л2.

**НАПОМЕНА:** У случају временских непогода праћених градом и оштећењима биљака кромпира, потребна је што хитнија заштита таквих биљака коришћењем превасходно неког од бакарних средстава , јер је оштећена биљка много подложнија нападу пламењаче и других обољења.

УЖИЦЕ 11.07.2016.