



## POLJOPRIVREDNA SAVETODAVNA I STRUČNA SLUŽBA „UŽICE“ DOO

31000 Užice Dimitrija Tucovića 125 Poštanski fah: 126  
tel: 031/513-754, 031/513-491 e-mail: pssuzice@sbb.rs

### **ИЗВЕШТАЈНО ПРОГНОЗНА СЛУЖБА ПССС УЖИЦЕ ОБЈАВЉУЈЕ ЗАШТИТУ ЗАСАДА МАЛИНЕ ДО 10 ДАНА ОД ПОЧЕТКА ЦВЕТАЊА**

Ова заштита се примењује од почетка цветања малине да би се заштитили цветови од узрочника сиве трулежи плодова (*Botrytis cinerea*). Паразит остварује заразу преко цветних делова, а касније са развојем и сазревањем плодова изазива њихово труљење. У наредном периоду се очекују честе, а некад и обилне кишне падавине, које се смењују са сунчаним интервалима. Овакви услови веома погодују развоју овог паразита. Препоручује се извођење заштите коришћењем неког од следећих фунгицида:

- **SWITCH** у концентрацији 0,08% (80gr у 100 l воде) или
- **TELDOR** у концентрацији 0,15 % (150 gr у 100 l воде) или
- **SIGNUM** у концентрацији 0,15 % (150 gr у 100 l воде) или
- **DIONAL** у концентрацији 0,20 % (200 gr у 100 l воде) или
- **LINUS** у концентрацији 0,15 % (150 gr у 100 l воде) или
- **LUNA SENSATION** у концентрацији 0,08% (80gr у 100 l воде)

Нека од ових средстава имају искључиву намену за спречавање појаве трулежи плодова малине (Switch, Teldor i Dional).

Временски услови утичу на интензиван пораст и развој родних гранчица и лисне масе. Све то ствара оптималне услове и за болести као што су *Didymella applanata* i *Leptosphaeria coniothyrium*. Због тога се једном од наведених средстава може додати:

- **QUADRIS** или **PROMESA** или **QUEEN** у концентрацији 0,075% (75 ml у 100 l воде)

**SIGNUM, LINUS** ili **LUNA SENSATION** делује истовремено и на сиву трулеж и на дидимелу, па се могу применити самостално.

Пре прскања потребно је прскалицу опрати детергентом и водом, добро је испрати, да се одстрани присуство инсектицида и других штетних материја за пчелу и плод малине.

Приликом овог третирања обавезно заштитити и младе изданке који се припремају за род наредне године. Прскање обавити у касним поподневним сатима и у препорученој фенофази развоја.

#### **НАПОМЕНА:**

ТОКОМ ПЕРИОДА ЦВЕТАЊА, А КАСНИЈЕ И БЕРБЕ ПЛОДОВА У ЗАСАДИМА МАЛИНЕ СЕ НЕ СМЕЈУ КОРИСТИТИ ИНСЕКТИЦИДИ НИ АКАРИЦИДИ ! УПОЗОРАВАЈУ СЕ ПРОИЗВОЂАЧИ ДА СЕ ПРИ ПРИМЕНИ ХЕМИЈСКИХ СРЕДСТАВА У ЗАШТИТИ МАЛИНЕ ПРИДРЖАВАЈУ ДАТИХ УПУСТАВА У ПОГЛЕДУ ИЗБОРА, ВРЕМЕНА ЊИХОВЕ ПРИМЕНЕ И КАРЕНЦЕ У ЗАСАДИМА МАЛИНЕ.

**ПРОИЗВОЂАЧИ, ПРИДРЖАВАЈТЕ СЕ ДАТИХ ПРЕПОРУКА ДА БИ СТЕ ПОСТИГЛИ ДОБАР КВАЛИТЕТ И ОМОГУЋИЛИ ДА МАЛИНА И ДАЉЕ ОСТАНЕ ГЛАВНИ ИЗВОЗНИ ПРОИЗВОД !**

УЖИЦЕ 09.05.2017.