

## Zaštita maline

### Štetočine maline

**Malinina buba** (*Byturus Tomentosus*)-ženke polažu jaja u otvoren cvet, ili tek zametnute plodove. Jedna ženka može da položi 30-40 jaja, iz kojih se razvijaju larve koje se hrane plodovima. Suzbijanje: pred cvetanje, polovinom maja, koristiti: Zolone liquid, Fenitroton, neonikotinoide.

**Malinin korebus** (*Corebus rubi*) – ženke u maju polažu jaja na donju polovinu izbojaka maline. Ispiljene larve iz jaja ubušuju se u izbojke. Larve mogu da unište i 90% rodni izbojaka, jer se u jednom izbojku razvija samo jedna, a retko dve larve. Suzbijanje- odsecati oštećene izbojke. Hemijska zaštita kao za malininu bubu.

**Malinin prstenar** (*Agrilus* sp.) – po načinu života slična predhodnoj vrsti. Pojavljuje se u isto vreme kao i korebus, tj. u drugoj polovini maja. Suzbijanje –isto kao i za korebus



### Štetočine maline

**Sušenje izbojaka** (*Didymella appplanata*)- Na kori ovogodišnjih letorasta pojavljuju se , obično oko spavajućih pupoljaka i u pazuhu peteljke lista, plavoljubičaste pege. Do jeseni pege zahvate ceo letorast, a zatim se zaražena kora počinje odlubljivati. Na pegama se mogu videti crne tačkice.

**Leptosferija** (*Leptosphaeria coniothirium*)- kora izbojaka dobija iznad samog zemljišta crvenkastu boju, puca i ljušti se. Izbojci se lako lome, ili se suše. Obe bolesti se pojavljuju kod pregustih zasada, zatim usled velike zakorovljenosti, a takođe i u nedostatku đubrenja. Malina je zbog plitkog korena osetljiva na slabo zemljište i sušu. Suzbijanje: Pre cvetanja, i kasnije 2-3 puta , prskati temeljno malinu preparatima: Cuprozin, Ditan, Mankozeb, Antracol, Quadris i dr. Seći i spaljivati obolele lastare.

**Siva plesan** (*Botrytis* spp.)- Zbog opasnosti od ostataka ne preporučuje se primena pesticida, već jedino proređivanje maline. Treba izbegavati i obilno đubrenje, posebno azotom.