



PSS INSTITUT TAMIŠ DOO
Istaživačko-razvojni centar

Novoseljanski put 33, 26000 Pančevo, R. Srbija

tel. 013/313-092, fax 013/373-002

E-mail: intam@panet.rs

www.institut-tamis.co.rs

www.polj.savetodavstvo.vojvodina.sr.gov.rs



STANJE AZOTA U ZEMLJIŠTU

JANUAR 2018

(naš teren)

Bogdan Garalejić dipl.ing. ratar-povrtar

064/8814407

b.garalejic@gmail.com


Uzorkovanje 08-10.01.2018.

- Lokaliteti:
 - 1. O.polje PSS Institut TAMIŠ- uz.1 i uz.2.
 - 2. Omoljica- uz.3.
 - 3. Jabuka- uz.4.
 - 4. ispred B.N.Sela – uz.5.

Sistem obrade	Bez obrade (konzervacijska)	Tanjiranje (redukovana)	Klasična (oranje)
Broj uzorka	1	2,3,4	5

Rezultati analize uzoraka

Parcela	Predusev	Dubina (cm)	vl% (zemlj.)	N-NO3 kg/ha	N-NO3 uk. Kg/ha 0-90cm	Dodati N a.m. (kg)
NoTill (Bez brade) ČOL	kukuruz	0-30	24	65,4	176	0
		30-60	23	59,9		
		60-90	23	51		
Tanjiranje ČOL	suncokret	0-30	22	61,2	291	0
		30-60	21	143,5		
		60-90	18	85,8		
Tanjiranje BKČ	kukuruz	0-30	27	45,2	339	0
		30-60	23	168,7		
		60-90	23	125		
Tanjiranje Č-RC	suncokret	0-30	27	55,8	209	0
		30-60	26	77,5		
		60-90	27	76,1		
Oranje ČLT	kukuruz	0-30	22	13,8	105	20
		30-60	23	63,1		
		60-90	18	28,5		



Preporuka

- Nema potrebe da se krene sa prihranom pšenice!
- Preporuka je da se koriste oblici lakopristupačnog azota kao NO_3 ili NH_4 ,
- Prihranu početi polovinom februara i najkasnije kraj februara (zavisi od vremenskih uslova i kretanja vegetacije),
- Druga prihrana od polovine marta,
- **Prva količina N a.m. 60 kg/ha ili 105-110 kg/kj (180 kg/ha) SAN ili AN,**
- **Ko ide UREU to je 130 kg/ha (od 10. februara).**



BEZ OBRÁDE (NO TILL)



ТАБИРАЊЕ (2x)



ТАЊИРАЊЕ (2x)

УЗОРАК 2

ЧЕРНОЗЕМ БЕЗ КАРБОНАТА



ОРАЊЕ
претс. прунр.
летва





Sl.1 bez obrade
Sl.2 tanjiranje
Sl.3 tanjiranje



Sl.4 oranje